

Laag risico diergroepen	Nadere toelichting	Stationaire PM SH gr 2 en gr 3 wk tz	Stationaire PM SH gr 3 mnd tz
Vleesvarkens	Slachtvarkens van rond de zes maanden oud. Dit betreft ook de langzame groeiers die als hobbyvarken worden gehouden.	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Paarden en ezels	Gedomesticeerde paarden en ezels		
Geiten ≥ 1 jaar, overige rassen	Geiten > 1 jaar, niet melktypisch		
Geit ≥ 6 maanden < 1 jaar	Geen specificatie behalve leeftijd		
Geit ≥ 6 weken < 6 maanden	Geen specificatie behalve leeftijd		
Schapen < 1 jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd		
Runderen ≥ 20 maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren		
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren		
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: regulier vleeskalf	"Z" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie		
Kalveren ≥ 6 weken < 8 maanden: regulier vleeskalf	"V" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie		
Waterbuffels	Waterbuffel, ongeacht leeftijd. Keuring is rundermethode, hier leeftijd wel van belang.		
Gekweekte wilde zwijnen	Gekweekt wild		
Gekweekte damherten	Gekweekt wild		
Gekweekte edelherten	Gekweekt wild		
Gekweekte moeflons	Gekweekt wild		
Alpaca's	Gekweekt wild		
Lama's	Gekweekt wild		
Emoes en struisvogels	Gekweekt wild		

Verhoogd risico diergroepen	Nadere toelichting	Stationaire PM SH gr 2 en gr 3 wk tz	Stationaire PM SH gr 3 mnd tz
Zeugen en beren	Varkens die voor gebruiksdoel fokkerij werden bestemd, pathologie te verwachten	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Overige varkens	Varkens die vóór de gangbare leeftijd van rond de zes maanden voor de slacht worden aangeboden, waaronder speenbiggen; pathologie te verwachten	ja, indien AM cat 1, alleen in bedrijven zonder "toestemming om varkensarkassen niet te splitsen"	ja, indien AM cat 1, alleen in bedrijven zonder "toestemming om varkensarkassen niet te splitsen"
Geiten ≥ 1 jaar, melktypisch	Melkgeiten ≥ 1 jaar. Reden voor slacht is meestal een aandoening waardoor gebruiksdoel fokkerij/melkerij niet meer haalbaar is; pathologie te verwachten	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Geit < 6 wkn	Geitenbokjes en -lammeren, uitstoot van de melkgeitenhouderij	nee	nee
Schapen ≥ 1 jaar oud	Schapen ≥ 1 jaar. Meestal uitstoot van fokkerij; pathologie kan aan de orde zijn	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Runderen ≥ 20 maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren ≥ 6 weken < 8 maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	nee	Ja, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM categorie 1 en geen permanent toezicht tijdens het slachten
Kalveren < 6 weken "Nuka"	Kalveren, rechtstreekse uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten	nee	nee