

Laag risico diergroepen	Nadere toelichting	Permanent toezicht
Vleesvarkens	Slachtvarkens van rond de zes maanden oud. Dit betreft ook de langzame groeiers die als hobbyvarken worden gehouden.	Nee, indien $\geq 95\%$ van de diergroep per kwartaal AM categorie 1 is
Paarden en ezels	Gedomesticeerde paarden en ezels	
Geiten ≥ 1 jaar, overige rassen	Geiten > 1 jaar, niet melktypisch	
Geit ≥ 6 maanden < 1 jaar	Geen specificatie behalve leeftijd	
Geit ≥ 6 weken < 6 maanden	Geen specificatie behalve leeftijd	
Schapen < 1 jaar oud	Geen specificatie behalve leeftijd	
Runderen ≥ 20 maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: vleesrunderen	Vleestypische runderen, dubbeldoel dieren	
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: regulier vleeskalf	"Z" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	
Kalveren ≥ 6 weken < 8 maanden: regulier vleeskalf	"V" kalveren, opfok voor gebruiksdoel vleesproductie	
Waterbuffels	Waterbuffel, ongeacht leeftijd. Keuring is rundermethode, die wel leeftijdsafhankelijk is	
Gekweekte wilde zwijnen	Gekweekt wild	
Gekweekte damherten	Gekweekt wild	
Gekweekte edelherten	Gekweekt wild	
Gekweekte moeflons	Gekweekt wild	
Alpaca's	Gekweekt wild	
Lama's	Gekweekt wild	
Emoes en struisvogels	Gekweekt wild	

Verhoogd risico diergroepen	Nadere toelichting	Permanent toezicht
Zeugen en beren	Varkens die voor gebruiksdoel fokkerij werden bestemd, pathologie te verwachten	Ja
Overige varkens	Varkens die vóór de gangbare leeftijd van rond de zes maanden voor de slacht worden aangeboden, waaronder speenbiggen; pathologie te verwachten	Ja, in bedrijven met "toestemming om varkenskarkassen niet te splitsen". Bij de andere slachthuizen: nee, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM cat 1
Geiten ≥ 1 jaar, melktypisch	Melkgeiten ≥ 1 jaar. Reden voor slacht is meestal een aandoening waardoor gebruiksdoel fokkerij/melkerij niet meer haalbaar is; pathologie te verwachten	Ja
Geit < 6 wkn	Geitenbokjes en -lammeren, uitstoot van de melkgeitenhouderij	Ja
Schapen ≥ 1 jaar oud	Schapen ≥ 1 jaar. Meestal uitstoot van fokkerij; pathologie kan aan de orde zijn	Nee, indien $\geq 95\%$ per kwartaal AM cat 1
Runderen ≥ 20 maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Runderen $\geq 12 < 20$ maanden: melktypische runderen	Runderen, uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren $\geq 8 < 12$ maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren ≥ 6 weken < 8 maanden: uitstoot vleeskalf	Kalveren, uitstoot van de melkveehouderij en kalvermesterij, vaak aangevoerd in kleine koppels, pathologie te verwachten en medicijngebruik kan aan de orde zijn	Ja
Kalveren < 6 weken "Nuka"	Kalveren, rechtstreekse uitstoot van de melkveehouderij, pathologie te verwachten	Ja