



Amoergrondel

Percottus glenii

Laatste update: 28-04-2025

Amoergrondel behoort tot de baarsachtigen. De vis is stevig gebouwd met vrij grote kop. De bek is bovenstandig en er zijn geen baarddraden. De vis bereikt een maximale lengte van 25 cm bij een gewicht van 250 g. Over het algemeen is de vis licht gekleurd met een uitgesproken vlekkenpatroon. In de paartijd kleuren de mannetjes donker.

Amoergrondel kan verward worden met andere baarsachtigen in Nederland, zoals baars (*Perca fluviatilis*), snoekbaars (*Sander lucioperca*), zonnebaars (*Lepomis gibbosus*) en pos (*Gymnocephalus cernua*). Deze vissoorten hebben echter harde stekelige vinstralen in de voorste rugvin. Bij Amoergrondel zijn deze vinstralen zacht. Daarnaast zijn de twee rugvinnen vergroeid bij pos en zonnebaars. Bij Amoergrondel zijn de twee rugvinnen niet vergroeid.



Foto: Paul van Hoof

Bron: [Nederlands Soortenregister](#)

1. Aanwezigheid en effect in Europa

Stand van zaken in 2024

Amoergrondel komt in meerdere Europese landen voor, zoals Duitsland, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Kroatië, Polen, Slowakije, Roemenië en Tsjechië. Bij het huidige klimaat en verwachte klimaatverandering kan de soort zich vestigen in bijna alle EU-lidstaten, met uitzondering van Cyprus en Malta.

Effect op biodiversiteit en ecosysteem

Amoergrondel predeert op en concurreert met inheemse vissen, amfibieën en macrofauna. In Oost-Europa zijn afnames van populaties van vissen en amfibieën bekend, onder andere van vetje, kroeskarper en kamsalamander. Amoergrondel kan drager zijn van tientallen verschillende parasieten, waardoor overdracht van parasieten naar inheemse soorten mogelijk is. Amoergrondel kan de meest dominante soort in een watersysteem worden en heeft zo een grote invloed op het voedselweb met een vergelijkbaar effect als zonnebaars. Met name in meren, vijvers en poelen kunnen grote populaties Amoergrondels ontstaan en daardoor ook grote negatieve effecten optreden.

Effect op ecosysteemdiensten

Amoergrondel kan een negatief effect hebben op ecosysteemdiensten door de concurrentie met commercieel belangrijke vissoorten. Daarnaast kan de vis het voedselweb en daarmee de eutrofiëringsprocessen beïnvloeden.

Overige effecten

Er zijn geen overige effecten bekend.

Deze effecten waren aanleiding voor plaatsing van Amoergrondel op de [Unielijst](#) van [EU-verordening 1143/2014](#).

2. Aanwezigheid en effect in Nederland

Stand van zaken in 2025

Voor zover bekend komt Amoergrondel nog niet in Nederland voor, maar verwacht wordt dat de vis zich goed kan vestigen in Nederland.

Effecten

Zie onder '1. Aanwezigheid en effect in Europa'.

3. Wet- en regelgeving

Amoergrondel staat sinds augustus 2016 op de Unielijst van invasieve exoten ([EU-verordening 1143/2014](#)). Een soort die op de Unielijst staat mag onder andere niet meer worden verhandeld en gehouden in EU-lidstaten. Verder geldt voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige populaties op te sporen, te verwijderen, of als dat niet lukt, zodanig te beheren dat verspreiding en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Het houden van deze soort is alleen mogelijk voor (wetenschappelijk) onderzoek of ex-situ bewaring. Hiervoor moet een vergunning worden aangevraagd bij [de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland \(RVO\)](#).

4. Wat te doen?

Particulieren en dierentuinen die deze soort al in bezit hadden voordat de Unielijst van kracht werd, mogen de dieren houden totdat ze een natuurlijke dood sterven. Voorwaarden zijn wel dat de dieren niet kunnen ontsnappen en dat men zorgt dat ze zich niet kunnen voortplanten.

Uitroeijing van deze vis is alleen mogelijk in kleine gesloten waterlichamen en kort na een invasie. Dit kan gedaan worden door de introductie van roofvissen, het droogleggen van het waterlichaam en het actief wegvangen met netten en electrobevissing. Aangezien Amoergrondel bestand is tegen lage zuurstofgehalten, vorst en uitdroging, zal het echter moeilijk zijn om alle exemplaren uit het systeem te verwijderen. Meer informatie over deze en andere mogelijke beheermaatregelen staat in [dit IUCN-rapport voor de Europese Commissie](#).

Meldingen van Amoergrondel in de natuur kunnen worden doorgegeven via [waarneming.nl](#).

5. Meer informatie

Oorsprongsgebied

Amoergrondel komt oorspronkelijk voor in Oost-Azië, onder meer in het stroomgebied van de rivier de Amoer.

Habitat

Amoergrondels komen voor in stilstaande wateren of wateren met een zwakke stroming, zoals meren, oude rivierlopen, poelen en (laag)veenmoerassen. De vis heeft een voorkeur voor wateren met een rijke watervegetatie.


Introductieroute Europa

Amoergrondel werd voor het eerst in de vorige eeuw gehouden en gekweekt als aquarium- en vijvervis. Door ontsnappingen of uitzettingen kwam deze vis in de natuur terecht. Ook is Amoergrondel gebruikt en verder uitgezet als aasvis in de sportvisserij.

Daarnaast kan deze vis, net zoals blauwband, onbedoeld meeliften met vistransporten, met name van karpers, ten behoeve van visuitzettingen voor de hengelsport. Een voorbeeld hiervan is de introductie van Amoergrondel in de rivier Tisza.

Vanuit de locaties waar Amoergrondel door de mens geïntroduceerd is, verspreidt de soort zich op eigen kracht verder.

Aanwezigheid in de EU



Links: Gevestigd in de EU in 2024 (rood gearceerde landen). Bron: [Šmejkal et al. 2024](#). Rechts: mogelijke vestiging in de EU bij het huidige klimaat (rood gearceerde landen). Bron: [Europese risicobeoordeling](#). In oranje zijn de overige EU-lidstaten aangegeven.

Introductieroute Nederland

De potentiële introductieroutes zijn gelijk aan die voor Europa. Op termijn zou Amoergrondel via de grote rivieren Nederland kunnen binnenkomen. Daarnaast kan deze vis meeliften met vistransporten ten behoeve van visuitzettingen voor de hengelsport.

Kans op introductie, vestiging en verspreiding

Amoergrondel zou Nederland op eigen kracht kunnen bereiken. Daarnaast kan het niet worden uitgesloten dat deze soort met vistransporten geïntroduceerd kan worden.

Er is voldoende geschikt habitat voor Amoergrondel in Nederland. De omstandigheden zijn ook gunstig voor de vestiging van deze vis. Bovendien is de vis in staat lage zuurstofconcentraties, waterverontreiniging en zelfs volledig droogvallen of bevriezing van het habitat te overleven.

6. Risicobeoordeling

[Europese risicobeoordeling](#)

7. Bronnen

- Nederlands Soortenregister. [Amoergrondel](#). Bezocht op 28-4-2025.
- Spikmans F, van Kessel N, Dorenbosch M, Kranenbarg J, Bosveld J & R. Leuven, 2010. [Plaag Risico Analyses van tien exotische vissoorten in Nederland](#). Nederlands Centrum voor Natuuronderzoek: Stichting RAVON, Radboud Universiteit Nijmegen, Stichting Bargerveen & Natuurbalans – Limes Divergens, Nijmegen.
- Šmejkal M, Dočkal O, Thomas K, Verma CR, Kumkar P & L. Kalous, 2024. [First record of highly invasive Chinese sleeper *Percottus glenii* Dybowski, 1877 \(Perciformes: Odontobutidae\) in the Elbe River Basin, Czechia](#). Aquatic Ecology 58, 125-130.
- Verreycken H, 2015. [Risk analysis of the Amur sleeper *Percottus glenii*](#), Risk analysis report of non-native organisms in Belgium, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2015, INBO.R.2015.11325556, updated version, Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 27 p.
- Verreycken H, 2019. [Information on measures and related costs in relation to the species included on the Union list: *Percottus glenii*](#). Technical note prepared by IUCN for the European Commission.