Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	*datum*	*Toelichting*
4.5	*30-09-2026*	*Toevoeging code Solanum lycopersicum*
4.4	*22-04-2025*	*Toevoeging origine Carica papaya*
4.3	*25-03-2026*	*Toevoeging origine en aanpassing code Solanum lycopersicum, aanpassing code Capsicum annuum*

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden – *Nicaragua*

NICARAGUA (NI)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	-	ja

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssystematiek waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.
Uitleg codes, zie NVWA-site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen

Legenda:
$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden
~ = de dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. Het kan enige tijd duren, de datasheet moet nog worden opgesteld.

Pre-exportcertificaten
De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat.
Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmerken-fytosanitair-certificaat

Algemene eisen

Certificaat vereist voor:
alle zaden.

Invoerverbod:
geen informatie beschikbaar

Certificeringseisen

Bijschrijvingen

Allium cepa
Origine Argentinië (database IPSA)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Verenigde Staten (database IPSA)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Puccinia allí (98).

Origine Zuid-Afrika (database IPSA)
El envío está libre de Botrytis aclada (2; 4 NL niet vrij; 5; 9; 13), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Australië, Turkije (database IPSA)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98) y Botrytis aclada (2; 4 NL niet vrij; 5; 9; 13).

Allium fistulosum
Origine Zuid-Afrika (database IPSA)
El envío está libre de Xanthomonas axonopodis pv. allii (98), Urocystis cepulae (98).

Apium graveolens
Origine Nederland (permit)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Beta vulgaris
Origine Frankrijk
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$.

Origine Nieuw-Zeeland
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa f. sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Brassica oleracea convar. capitata
Origine Verenigde Staten (permits)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98).

Brassica pekinensis (NI gebruikt de naam Brassica rapa subsp. pekinensis)
Origine Australië (database IPSA)
El envío está libre de Alternaria japonica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)$, Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Botryotinia fuckeliana (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Hyaloperonospora parasitica (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13); Leptosphaeria maculans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6 ;9; 13), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Italië (database IPSA)
El envío está libre de Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)$, Alternaria japonica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Hyaloperonospora parasitica (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Leptosphaeria maculans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Capsicum annuum
Origine China
El envío está libre de Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), tobacco streak virus (98).

Origine Mexico (IPSA)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), tomato brown rugose fruit virus (2), Xanthomonas euvesicatoria pv. euvesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Peru (IPSA)
El envío está libre de Choanephora cucurbitarum (98), alfalfa mosaic virus (98), potato yellowing virus (98), tomato bushy stunt virus (98), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Vietnam
El envío está libre de tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11 ;13).
Geen bijschrijvingen.

Carica papaya
Origine Thailand (IPSA)
El envío está libre de Choanephora cucurbitarum (98)

Origine Filipijnen,Taiwan (database IPSA)
Geen bijschrijvingen.

Citrullus lanatus
Origine India database (IPSA)
El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Trogoderma granarium (V), Fusarium oxysporum f.sp. niveum (13), squash mosaic virus (98).

Origine Thailand database (IPSA)
El envío está libre de cucumber mosaic virus (98), Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

Cucumis melo
Origine Thailand database (IPSA)
El envío libre de: Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Cucumber mosaic virus (98), Cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Cucumis sativus
Origine China database (IPSA)
El envío libre de: Cucumber mosaic virus (98), Squash mosaic virus (98), Cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), Prunus necrotic ringspot virus (99), Alternaria brassicicola (99), Choanephora cucurbitarum (98), Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Thailand (database IPSA)
El envío está libre de Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Cucurbita maxima
Origine Thailand (database IPSA)

El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Choanephora cucurbitarum (98).

Cucurbita moschata
Origine Filipijnen (database IPSA)
El envío está libre de Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Thailand (database IPSA)
El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Cucurbita pepo
Origine Brazilië
El envío está libre de Acidovorax citrulli (2; 4 NL vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), zucchini yellow mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China (permits)
El envío está libre de Berkeleyomyces basicola (98), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Trogoderma granarium (V).

Origine India
El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato leaf curl New Delhi virus (98), zucchini yellow mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

Origine Filipijnen (permits)
El envío está libre de Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Thailand (database IPSA)
El envío está libre de Acidovorax citrulli (2; 4 NL vrij; 5; 6; 9), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Origine Verenigde Staten
El envío está libre de Acidovorax citrulli (2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), Gibberella avenacea (98), zucchini yellow mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

Daucus carota
Origine Australië
El envío está libre de Albugo candida (99). Gibberella avenacea (98), Xanthomonas hortorum pv. carotea (2; 4; 5; 6; 9; 13), Amaranthus retroflexus (V), Fumaria officinalis (V), Setaria viridis (V).

Origine Nieuw-Zeeland
El envío está libre de Albugo candida (99), Alternaria longipes (98), Alternaria radicina (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), arabis mosaic virus (99), Gibberella avenacea (98).

Lactuca sativa
Origine Chili, Nederland (permits)
El envío está libre de lettuce mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), alfalfa mosaic virus (98), tobacco streak virus (98).

Origine Verenigde Staten (permits)
El envío está libre de Gibberella avenacea (99).

Petroselinum crispum
Origine Verenigde Staten
El envío está libre de Septoria apiicola (99), broad bean wilt virus (98).

Raphanus sativus
Origine China (database IPSA)
El envío está libre de Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)$, Ambrosia artemisiifolia (V), cucumber mosaic virus (98), Hyaloperonospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nieuw-Zeeland (database IPSA)
El envío está libre de Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)$.

Origine Frankrijk (database IPSA)
El envío está libre de Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Verenigde Staten
Geen bijschrijvingen.

Solanum lycopersicum
Origine China (database IPSA)
El envío está libre de potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), alfalfa mosaic virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Pseudomonas syringae pv. tomato (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13) y Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine India (database IPSA)
El envío está libre de Alternaria brassicicola (99), Didymella lycopersici (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Phytophthora cactorum (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Clavibacter michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Trogoderma granarium (V), Commelina benghalensis (V), Cyanthillium cinereum (V~), Orobanche ramosa (V).

Origine Mexico (database IPSA)
El envío está libre de tomato brown rugose fruit virus (2), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tomato bushy stunt virus (98).

Origine Peru (database IPSA)
El envío está libre de potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9) , tomato bushy stunt virus (98).

Origine Thailand (brief aan EU, d.d. 29-jul-2024)
En inspección fitosanitaria realizada y/o posterior análisis de laboratorio, las semillas se encontraron libres de Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland en Verenigde Staten (database IPSA)
Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.
Land: ***Nicaragua***

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.