



Certificering van levend pluimvee en broedeieren- bijlage 1

Code: **HT-ECOL-PLUIU-01b1** Versie: 02

Aanvullende eisen voor de verplaatsing van pluimvee en broedeieren naar lidstaten met de status vrij van infectie met het virus van de ziekte van Newcastle zonder vaccinatie.

Finland en Zwitserland voldoen ten aanzien van Newcastle disease (NCD) aan de in artikel 36 van Vo 2016/429 vastgestelde criteria. Zweden is in 2026 begonnen met het vaccineren van pluimvee tegen NCD en heeft daarmee niet langer de vrij-status en accepteert nu zowel niet gevaccineerd als gevaccineerd pluimvee.

Broedeieren

- Niet gevaccineerd tegen NCD
- Zijn afkomstig van koppels die:
 - Niet zijn gevaccineerd tegen NCD óf
 - Zijn gevaccineerd tegen de NCD met een geïnactiveerd vaccin óf
 - Gevaccineerd zijn tegen infectie met NCD met levende vaccins die voldoen aan de criteria van Bijlage VI van Vo 2020/688, en die tenminste 30 dagen voor het verzamelen van de broedeieren heeft plaatsgevonden.

Eendagskuikens

- Mogen niet tegen NCD zijn gevaccineerd.
- Moeten afkomstig zijn van broedeieren die voldoen aan de gestelde voorwaarden voor broedeieren.
- Moeten afkomstig zijn van broedeieren die in de broederij zijn uitgebroed op volstrekt andere plaatsen en tijdstippen dan de eieren die niet voldoen aan de gestelde voorwaarden voor broedeieren.

Fok- en gebruikspluimvee

- is niet tegen NCD gevaccineerd.
- Is 14 dagen voor vertrek geïsoleerd, hetzij in de inrichting van oorsprong onder toezicht van een officiële dierenarts (zie [Pre-export isolatie | Voorschrift | NVWA](#)), hetzij in een erkende quarantaine-inrichting waar:
 - In de laatste 21 dagen voor het vertrek geen pluimvee is gevaccineerd tegen NCD
 - In de laatste 21 dagen voor vertrek geen andere vogels zijn binnengebracht
 - In de quarantaine-inrichting is geen vaccinatie uitgevoerd

- Is in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen NCD d.m.v. een representatieve serologische test (kan een prevalentie van 5% met een betrouwbaarheid van 95% detecteren) met negatief resultaat.
- Voor dit onderzoek wordt bij ten minste 60 willekeurig gekozen dieren, bloedmonsters genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte van ≤ 60). De monsters worden onderzocht volgens de voorschriften van BE/92/340/EEG.

Indien dieren een positieve titer hebben, worden zij verwijderd en begint de isolatieperiode opnieuw. Het bloedonderzoek moet opnieuw plaatsvinden, niet eerder dan 14 dagen na het vorige NCD-onderzoek.

Loopvogels

Bij loopvogels (Ratites) worden veel aspecifieke reageerders aangetroffen, mede doordat de onderzoeksmethode op kippen is toegespitst. In onderstaande tabel is aangegeven, hoe hier mee moet worden omgegaan.

Uitslag	Actie
Alle negatief	Export
Negatief en positief	Verwijderen van de positieve dieren uit de isolatieruimte. Opnieuw monsternamen overige dieren, vanaf 14 dagen na de eerste monsternamen
Negatief en aspecifiek	Aspecifiek heronderzoeken (andere test in overleg met het WBVR, te Lelystad), dit kan meteen. Indien deze test negatief is mogen de bij de eerste test negatieve dieren worden geëxporteerd. De (heronderzochte) aspecifiek geteste dieren mogen NIET geëxporteerd worden.
Negatief, positief en aspecifiek	Verwijderen van de positieve EN aspecifieke dieren uit de isolatie. De positieve dieren mogen niet van het bedrijf. Vanaf 14 dagen na de eerste monsternamen is heronderzoek van de overige dieren toegestaan.

Slachtpluimvee

- Indien de dieren niet gevaccineerd zijn tegen NCD:
 - Zijn deze in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen NCD d.m.v. een representatieve serologische test (kan een prevalentie van 5% met een betrouwbaarheid van 95% detecteren) met negatief resultaat.
 - Voor het onderzoek worden bij tenminste 60 willekeurig gekozen dieren, bloedmonsters genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte van ≤ 60). De monsters worden onderzocht volgens de voorschriften van BE/92/340/EEG.
- Indien de dieren wel zijn gevaccineerd tegen NCD;
 - Zijn deze in de laatste 14 dagen voorafgaand aan de verzending op basis van een representatief monster onderzocht op de aanwezigheid van het NCD-virus d.m.v.

virusisolatie, met negatief resultaat. Zodanig uitgevoerd dat een prevalentie van 5% met een betrouwbaarheid van 95% kan worden gedetecteerd.

Voor het onderzoek worden bij tenminste 60 willekeurig gekozen dieren, cloacaswabs of faecesmonsters genomen (of van alle dieren bij een koppelgrootte van ≤ 60). De monsters worden onderzocht volgens de voorschriften van BE/92/340/EEG.